


2か月 チェック
4か月 健診

9か月 健診
1歳 チェック

5歳 チェック



	歳	ヶ月	0歳											1歳											2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13歳以上									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0																				
B型肝炎	不活	定期		① /	② /		←	③ /	...	→	③は②の後 3ヶ月から9ヶ月																																
ロタ 1価 iワックス	生	任意		① /	② /	...	→	初回は14週6日(3ヶ月半)前まで 最終は24週0日(5ヶ月半)まで											できるだけ初回投与は 生後90日以内に																											
ロタ 5価 iワックス	生	任意		① /	② /	③ /	...	→	初回は14週6日(3ヶ月半)前まで 最終は28週0日(7ヶ月半)まで											できるだけ初回投与は 生後90日以内に																										
ヒブ	不活	定期		① /	② /	③ /	③から7ヶ月以上あけ 1歳過ぎ											←	④ /	→																						
肺炎球菌	不活	定期		① /	② /	③ /	③から60日以上あけ 1歳過ぎ											←	④ /	→																						
4種混合	不活	定期		① /	② /	③ /	③から6ヶ月~1年半あけて											←	④ /	→																	
3種混合+ポリオ	不活	定期		基本は4種混合と同じ			ポリオは経口、皮下注合わせて4回接種																																							
BCG	生	定期				① /	→																																	
麻疹風疹	生	定期										① /																																		
おたふくかぜ	生	任意										① /																																		
みずぼうそう	生	定期										① /	←	② /	→																				
日本脳炎	不活	定期																																												
インフルエンザ	不活	任意																																												
子宮頸癌 2価 サーバリックス	不活	定期																																												
子宮頸癌 4価 ガーダシル	不活	定期																																												

生ワクチンの後は27日あける
不活化ワクチンの後は6日あける

定期接種期間
接種可能期間

母子手帳チェック
2か月 1歳までの予防接種スケジュール確認
1歳 1歳以降の予防接種確認
5歳 小学校前の予防接種(特に麻疹風疹)の確認

- 就学時、11~12歳時の百日咳ワクチン(三種混合) 有料(任意接種)ですが推奨されています。
- 就学時のポリオワクチン追加 有料(任意接種)